


NÅR RØDE HØNSEMIDER SUGER BLOD FRA HØNEN KAN DET FØRE TIL:^{1,2}

- ▶ Kløe
- ▶ Hudirritation
- ▶ Forstyrret nattesøvn
- ▶ Stress
- ▶ Øget kortisolniveau i blodet
- ▶ Fjerplukning
- ▶ Immunsuppresion
- ▶ Øget modtagelighed for andre sygdomme
- ▶ Anæmi
- ▶ Øget dødelighed
- ▶ Blodpletter på æg
- ▶ Nedsat ægproduktion
- ▶ Nedsat skalkvalitet
- ▶ Mennesker, som opholder sig i hønsehuset kan blive bidt af hønsemider



1) Sparagano, Olivier & George, David & Harrington, David & Giangaspero, Annunziata. (2014). Significance and Control of the Poultry Red Mite, *Dermanyssus gallinae*. Annual review of entomology. 59. 447-66.

2) D. Temple et. al. 2018. Effects of a treatment against *Dermanyssus gallinae* with fluralaner on welfare parameters in laying hens. In: World's Poultry Science Journal Proceedings of the XVth European Poultry Conference, Dubrovnik, Croatia, 17-21 September 2018. Page 230. ISBN 978-90-829157-0-9.